


DBd療法(1~3コース目)

- * 注射薬(ダラツムマブ=ダラキューロ[®]、ボルテゾミブ)を使う治療法です。
- * 3週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * ダラキューロ[®]は、1,8,15日目に皮下注します。
- * ボルテゾミブは、1,4,8,11日目に皮下注します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース = 3週間＞



ダラキューロ[®]皮下注
(15mL)



ボルテゾミブ皮下注
(1.3mg × 体表面積)



皮下注 1、8日目

<皮下注>

①



ダラキューロ®が混ざっています

②



ボルテゾミブが混ざっています

皮下注 4、11日目

<皮下注>

①



ボルテゾミブが混ざっています

皮下注 15日目

<皮下注>



ダラキューロ®が混ざっています

飲み薬 1、8、15日目



モンテルカストOD錠10mg

1回1錠



アセトアミノフェン錠300mg

1回3錠



d-クロルフェニラミン錠2mg

1回1錠

} ダラキューロ®配合皮下注投与の1～3時間前

飲み薬 1、2、4、5、8、9、11、12、15日目



レナデックス®錠4mg

1回5錠

ダラキューロ®配合皮下注投与の1～3時間前
または、1日1回朝食後