




イー・エル・ディー  
ELd療法




\* 点滴薬(エロツズマブ=エムプリシティ®)、飲み薬(レナリドミド=レブラミド®、デキサメタゾン=レナデックス®)を使う治療法です。

\* 28日間を1コースとして以下の治療を繰り返します。

<1~2サイクル>

(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23~ 28	
エムプリシティ® (10mg/kg) 	●							●							●								●	
レブラミド®カプセル 1日1回 	→																							
レナデックス®錠 1日1回 	28 mg							28 mg							28 mg								28 mg	

<3サイクル以降>

(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23~ 28	
エムプリシティ® (10mg/kg) 	●														●									
レブラミド®カプセル 1日1回 	→																							
レナデックス®錠 1日1回 	28 mg							40 mg							28 mg								40 mg	

# 点滴

1～2サイクル1,8,15,22日目  
3サイクル以降 1,15日目

## (重要な注意)

アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。  
車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

### <メイン>

①



脱力感、めまい、息苦しい、唇が青くなる、苦しくて早い呼吸、冷や汗、胸の痛み、意識混濁などの症状があらわれた場合は、ただちに医療者に連絡してください。

### <側管>

② 15分



③ 15分



④ 30分



⑤ 開始時はゆっくり点滴し  
徐々に点滴速度を速くします  
(初回は特に慎重に行います)



エムプリシティ®が  
混ざっています

お薬によるアレルギーを  
予防する薬が混ざって  
います。

- ・デキサート®
- ・ファモチジン®
- ・ポララミン®