

Pola-BR療法

- * 点滴薬(リツキシマブ、ポライビー[®] = ポラツズマブ ベドチン、トレアキシ[®] = ベンダムスチン塩酸塩)を使う治療法です。
- * 3週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース=3週間>

1



リツキシマブ
($375\text{mg} \times \text{体表面積}$)

2



ポライビー[®]
($1.8\text{mg} \times \text{体重}$)

3



トレアキシ[®]
($90\text{mg} \times \text{体表面積}$)



トレアキシ[®]
($90\text{mg} \times \text{体表面積}$)

21 (日)

点滴 1日目

(重要な注意)

アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。
車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

脱力感、めまい、息苦しい、唇が青くなる、苦しくて早い呼吸、冷や汗、胸の痛み、意識混濁などの症状があらわれた場合は、ただちに医療者に連絡してください。

<メイン>

① 血管ルート確保



<側管>

② 30分



お薬によるアレルギーを
予防する薬が混ざって
います。
・ポララミン®

③ 30分



お薬によるアレル
ギーを予防する薬
が混ざっています。
・ソルコーテフ®

④



リツキシマブが
混ざっています

開始時はゆっくり点滴し徐々に
点滴速度を速くします
(初回は特に慎重に行います)

<メイン>

① 血管ルート確保



<側管>

② 30分



お薬によるアレルギーを
予防する薬が混ざってい
ます。
・ポラミン®

③ 15分



お薬による吐き気や
アレルギーを予防
する薬が混ざってい
ます。
・デキサート®

④ 初回90分、2回目以降30分



ポライビー®が
混ざっています

⑤ 15分



お薬による吐き気を予防
する薬が混ざっています。
・グラニセトロン®

⑥ 10分



トレアキシン®が
混ざっています

<メイン> ① 血管ルート確保



<側管>

② 15分



お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。
・グラニセトン®

③ 10分



トレアキシシン®が混ざっています

飲み薬
(吐き気止め) 3、4日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用