# CBDCA+DTX療法
（カルボプラチン　ドセタキセル）

＊点滴薬（カルボプラチン＋ドセタキセル）を使う治療法です。
＊3～4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
＊1日目にカルボプラチン、ドセタキセルを点滴します。
＊体表面積は身長と体重から計算されます。

**＜1コース = 3～4週間＞**

カルボプラチン点滴
（5～6AUC）
※腎機能に応じて量を調節します

ドセタキセル点滴
（60mg×体表面積）

川崎市立多摩病院　化学療法運営委員会
薬剤部

# 点滴　1日目

＜メイン＞

① 血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

② 30分 ➡ ③ 15分 ➡ ④ 90分 ➡ ⑤ 1時間 ➡ 終了

お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ

お薬によるアレギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・グラニセトロン
・デキサート®

ドセタキセルが混ざっています

カルボプラチンが混ざっています

# 飲み薬　2～4日目

デカドロン®錠4mg
（吐き気止め）

1回1個　1日2回　朝・昼食後に服用