CBDCA+GEM療法

（カルボプラチン　ゲムシタビン）

＊点滴薬（カルボプラチン、ゲムシタビン）を使う治療法です。
＊3～4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
＊1日目にカルボプラチンを、1、8日目にゲムシタビンを点滴します。
＊体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース = 3～4週間＞

カルボプラチン点滴
（5～6AUC）
※腎機能に応じて量を調節します

ゲムシタビン点滴
（1000mg×体表面積）

ゲムシタビン点滴
（1000mg×体表面積）

川崎市立多摩病院　化学療法運営委員会
薬剤部

点滴　1日目

＜メイン＞

①　血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

② 30分　➡　③ 15分　➡　④ 30分　➡　⑤ 1時間　➡　終了

お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・グラニセトロン
・デキサート®

ゲムシタビンが混ざっています

カルボプラチンが混ざっています

飲み薬　2～4日目

デカドロン®錠4mg
（吐き気止め）

1回1個　1日2回　朝・昼食後に服用

点滴　8日目

＜メイン＞

①　血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

②15分　➡　③30分　➡　終了

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・デキサート®

ゲムシタビンが混ざっています