CBDCA+Pemetrexed+BV療法

カルボプラチン　ペメトレキセド　ベバシズマブ

＊点滴薬（カルボプラチン、ペメトレキセド、
　アバスチン®（＝ベバシズマブ））を使う治療法です。
＊3週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
＊1日目にカルボプラチン、ペメトレキセド、アバスチン®を点滴します。
＊体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース = 3週間＞

1　　21（日）

カルボプラチン点滴
（5～6AUC）
※腎機能に応じて量を調節します

ペメトレキセド点滴
（500mg×体表面積）

アバスチン®点滴
（15mg×体重）

ペメトレキセドの副作用軽減のため、葉酸1日1回0.5gを連日内服
ビタミンB12 1回1mgを9週毎に筋肉注射

川崎市立多摩病院　化学療法運営委員会
薬剤部

点滴　1日目

＜メイン＞

① 血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

② 30分 ➡ ③ 15分 ➡ ④ 30分 ➡ ⑤ 10分 ➡ ⑥ 30分 ➡ ⑦ 1時間 ➡ 終了

お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ

お薬によるアレルギーや吐き気、皮疹を予防する薬が混ざっています。
・グラニセトロン
・デキサート®

アバスチン®が混ざっています

ペメトレキセドが混ざっています

カルボプラチンが混ざっています

飲み薬　0日目

デカドロン®錠4mg
（皮疹予防）

1回1個　1日2回　朝・昼食後に服用

飲み薬　2~4日目

デカドロン®錠4mg
（吐き気止め）

1回1個　1日2回　朝・昼食後に服用