

カルボプラチン エスワン

# CBDCA+S-1療法

- \* 飲み薬(エスワン錠)と点滴薬(カルボプラチン)を使う治療法です。
- \* 3週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* エスワン錠は、朝・夕食後の1日2回、14日間毎日続けて服用し7日間休みます。カルボプラチンは1日目に点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

## <1コース = 3週間>

エスワン服用(1日2回 朝夕食後) 14日間

体表面積	エスワン投与量
1.25㎡未満	40mg/回
1.25㎡以上1.5㎡未満	50mg/回
1.5㎡以上	60mg/回



カルボプラチン点滴  
(5AUC)

※腎機能に応じて量を調節します

# 点滴 1日目

## <メイン>

### ① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

## <側管>

② 30分 → ③ 15分 → ④ 1時間 → 終了



お薬による吐き気を  
予防する薬が混ざっ  
ています。  
・ホスアプレピタント



お薬によるアレルギー  
や吐き気を予防する  
薬が混ざっています。  
・グラニセトロン  
・デキサート®



カルボプラチンが  
混ざっています

## 飲み薬 2~4日目



デカドロン®錠4mg  
(吐き気止め)

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用