CBDCA+VP−16＋ Atezolizumab療法

（カルボプラチン）（エトポシド）（アテゾリズマブ）

＊点滴薬（カルボプラチン、エトポシド、テセントリク®(=アテゾリズマブ)）を使う治療法です。
＊3週間を1コースとして以下の治療を4コース繰り返します。
＊1日目にカルボプラチンとテセントリク®を、1、2、3日目にエトポシドを点滴します。
＊体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース = 3週間＞

エトポシド点滴
（100mg×体表面積）

エトポシド点滴
（100mg×体表面積）

エトポシド点滴
（100mg×体表面積）

カルボプラチン点滴
（5AUC）
※腎機能に応じて量を調節します

テセントリク®点滴
（1200mg）

川崎市立多摩病院　化学療法運営委員会
薬剤部

点滴　1日目

＜メイン＞

①　血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

② 30分　➡　③ 15分　➡　④初回 60分　➡　⑤ルートキープ　➡　⑥ 90分　➡　⑦ 1時間　➡　終了

2回目以降30分

テセントリク®が
混ざっています

エトポシドが
混ざっています

カルボプラチンが
混ざっています

お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。
・ホスアプレピタント

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・グラニセトロン
・デキサート®

点滴　2、3日目

＜メイン＞

①　血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

② 15分　➡　③ 90分　➡　終了

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・デキサート®

エトポシドが
混ざっています