


カルボプラチン エトポシド デュルバルマブ

CBDCA+VP-16 + Durvalumab療法

- * 点滴薬(カルボプラチン、エトポシド、イミフィンジ®(=デュルバルマブ))を使う治療法です。
- * 3週間を1コースとして以下の治療を4コース繰り返します。
- * 1日目にカルボプラチンとイミフィンジ®を、1、2、3日目にエトポシドを点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース = 3週間>



カルボプラチン点滴
(5AUC)

※腎機能に応じて量を調節します

イミフィンジ®点滴
(1500mg)

※体重30kg以下のとき20mg × 体重

点滴 1日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 60分 → ③ 5分 → ④ 30分 → ⑤ 15分 → ⑥ 90分 → ⑦ 1時間 → 終了



イミフィンジ®が混ざっています



お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。
・ホスアプレピタント



お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・グラニセトロン
・デキサート®



エトポシドが混ざっています



カルボプラチンが混ざっています

点滴 2、3日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 15分 → ③ 90分 → 終了



お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・デキサート®



エトポシドが混ざっています