CBDCA+nab−PTX療法

（カルボプラチン　ナブパクリタキセル）

＊点滴薬（カルボプラチン＋アブラキサン®（＝パクリタキセル））を使う治療法です。
＊3週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
＊1日目にカルボプラチンを、1、8、15日目にアブラキサン®を点滴します。
＊体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース = 3週間＞



カルボプラチン点滴
（5～6AUC）
※腎機能に応じて量を調節します

アブラキサン®点滴　アブラキサン®点滴　アブラキサン®点滴
（100mg×体表面積）（100mg×体表面積）（100mg×体表面積）

川崎市立多摩病院　化学療法運営委員会
薬剤部

点滴　1日目

＜メイン＞

① 血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

②30分 ➡ ③15分 ➡ ④全開 ➡ ⑤30分 ➡ ⑥全開 ➡ ⑦1時間 ➡ 終了

お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。
・ホスアプレピタント

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・グラニセトロン
・デキサート®

アブラキサン®が混ざっています

カルボプラチンが混ざっています

飲み薬　2～4日目

デカドロン®錠4mg
（吐き気止め）

1回1個　1日2回　朝・昼食後に服用

点滴　8、15日目

＜メイン＞

① 血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

②15分 ➡ ③全開 ➡ ④30分 ➡ ⑤全開 ➡ 終了

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・グラニセトロン
・デキサート®

アブラキサン®が混ざっています