


2W CPT-11 + セツキシマブ療法

- * 点滴薬(イリノテカン[®]とアービタックス[®](=セツキシマブ))を使う治療法です。
- * 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目にイリノテカン[®]とアービタックス[®]を、8日目にアービタックス[®]を点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 2週間>



1日目

イリノテカン[®] (150mg × 体表面積)

8日目

アービタックス[®]点滴(250mg × 体表面積)

アービタックス[®]点滴
(初回400mg × 体表面積、2回目以降250mg × 体表面積)

点滴 1日目

(重要な注意)
アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。
車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 15分



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。
・パロノセトロン
・デキサート®
・ポララミン®



③ 初回 2時間 2回目以降1時間



アビタックス®が
混ざっています



④ 90分



イリノテカン®が
混ざっています

飲み薬 (吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用

点滴 8日目

(重要な注意)

アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。
車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 15分



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。
・デキサート®
・ポララミン®



③ 1時間



アービタックス®が
混ざっています