

エンコラフェニブ＋ビニメチニブ＋セツキシマブ療法

- * 点滴薬1種類(アービタックス®(=セツキシマブ))と内服薬2種類(ビラフトビ®(=エンコラフェニブ))と(メクトビ®(=ビニメチニブ))を使う治療法です。
- * 1週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * アービタックス®を1日目に点滴します。
- * ビラフトビは1日1回朝食後、メクトビは1日2回朝夕食後に毎日服用します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 1週間>



ビラフトビ®服用(1日1回)

メクトビ®服用(1日2回)

ビラフトビ®投与量 1回 300mg

メクトビ®投与量 1回 45mg

1



7

(日)

アービタックス®点滴

(初回:400mg/m², 2回目以降:250mg/m²)

点滴 1日目

(重要な注意)

アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。
車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 15分



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。

- ・デキサート®
- ・ポララミン®



③ 初回 2時間 2回目以降 1時間



アービタックス®が
混ざっています