

# エンコラフェニブ＋セツキシマブ療法

- \* 点滴薬(アービタックス®(=セツキシマブ))と内服薬(ビラフトビ®(=エンコラフェニブ))を使う治療法です。
- \* 1週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* アービタックス®を1日目に点滴します。
- \* ビラフトビ®は、1日1回朝食後に毎日服用します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース 分= 1週間＞

ビラフトビ®服用(1日1回 朝食後)

〔 ビラフトビ®投与量 1回 300mg 〕



1



7

(日)

アービタックス®点滴

(初回:400mg/m<sup>2</sup>, 2回目以降:250mg/m<sup>2</sup>)

# 点滴 1日目

## (重要な注意)

アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

### <メイン>

#### ① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

### <側管>

#### ② 15分



お薬によるアレルギー  
や吐き気を予防する薬  
が混ざっています。

- ・デキサート®
- ・ポララミン®



#### ③ 初回 2時間 2回目以降 1時間



アービタックス®が  
混ざっています