


フォルフィリ

FOLFIRI療法

- * 3種類の点滴薬（イリノテカン[®]、レボホリナート[®]、フルオロウラシル[®]）を組み合わせて使う治療法です。
- * 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目に3種類点滴します。フルオロウラシル[®]は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース 分= 2週間＞

1~3日目 フルオロウラシル[®]点滴（2400mg × 体表面積）



1日目

イリノテカン[®]点滴（150mg × 体表面積）

レボホリナート[®]点滴（200mg × 体表面積）

フルオロウラシル[®]点滴（400mg × 体表面積）

点滴 1日目


<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

携帯型ポンプ(インフューザーポンプ)



投与開始時

投与終了時

<側管>

② 15分



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。
・パロノセトロン
・デキサート®

③ 90分



イリノテカン®が
混ざっています

④ 10~15分



フルオロウラシル®
が混ざって
います

⑤ 46時間



フルオロウラシル®が
混ざって
います

※3日目に終了します

③ 2時間



レボホリナート®が
混ざっています

飲み薬 (吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用