


フォルフィリ

# FOLFIRI＋アフリベルセプト療法

- \* 4種類の点滴薬（イリノテカン、レボホリナート、フルオロウラシル、ザルトラップ®（＝アフリベルセプト））を組み合わせる治療法です。
- \* 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* 1日目に4種類点滴します。フルオロウラシルは、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース＝2週間＞

1～3日目 フルオロウラシル点滴（ $2400\text{mg} \times \text{体表面積}$ ）



1日目

イリノテカン点滴（ $150\text{mg} \times \text{体表面積}$ ）

レボホリナート点滴（ $200\text{mg} \times \text{体表面積}$ ）

フルオロウラシル点滴（ $400\text{mg} \times \text{体表面積}$ ）

ザルトラップ®点滴（ $4\text{mg} \times \text{体重}$ ）


# 点滴 1日目

## <メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします



## <側管>

② 15分



お薬によるアレルギー  
や吐き気を予防する薬  
が混ざっています。  
・パロノセトロン  
・デキサート®

② 60分



ザルトラップ®  
が混ざっています

③ 90分



イリノテカン  
が混ざっています

③ 2時間



レボホリナート  
が混ざっています

④ 10~15分



フルオロウラシル  
が混ざっています

⑤ 46時間



フルオロウラシル  
が混ざっています  
※3日目に終了します

# 飲み薬 (吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用