


フォルフィリ

FOLFIRI+セツキシマブ療法

- * 4種類の点滴薬(イリノテカン[®]、レボホリナート[®]、フルオロウラシル[®]、アービタックス[®](=セツキシマブ))を組み合わせて使う治療法です。
- * 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目に4種類、8日目に1種類点滴します。
- * フルオロウラシル[®]は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース分=2週間>

1~3日目 フルオロウラシル[®]点滴 (2400mg × 体表面積)



1日目

イリノテカン[®]点滴 (150mg × 体表面積)

レボホリナート[®]点滴 (200mg × 体表面積)

フルオロウラシル[®]点滴 (400mg × 体表面積)

アービタックス[®]点滴 (初回400mg × 体表面積、2回目以降250mg × 体表面積)

8日目

アービタックス[®]点滴 (250mg × 体表面積)

点滴 1日目


(重要な注意)
アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。
車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします



<側管>

② 15分



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。
・パロノセトロン
・デキサート®
・ポララミン®

② 初回 2時間 2回目以降1時間



アービタックス®が
混ざっています

③ 90分



イリノテカン®が
混ざっています

③ 2時間



レボホリナート®が
混ざっています

④ 10~15分



フルオロウラシル®
が混ざって
います

⑤ 46時間



フルオロウラシル®が
混ざって
います

※3日目に終了します

飲み薬 (吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用

点滴 8日目

(重要な注意)

アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。
車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 15分



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。
・デキサート®
・ポララミン®



③ 1時間



アービタックス®が
混ざっています