


フォルフィリ

# FOLFIRI + パニツムマブ療法

- \* 4種類の点滴薬 (イリノテカン<sup>®</sup>、レボホリナート<sup>®</sup>、フルオロウラシル<sup>®</sup>、ベクティビックス<sup>®</sup>(=パニツムマブ)) を組み合わせて使う治療法です。
- \* 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* 1日目に4種類点滴します。フルオロウラシル<sup>®</sup>は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 2週間>

1~3日目 フルオロウラシル<sup>®</sup>点滴 (2400mg × 体表面積)



1日目

イリノテカン<sup>®</sup>点滴 (150mg × 体表面積)

レボホリナート<sup>®</sup>点滴 (200mg × 体表面積)

フルオロウラシル<sup>®</sup>点滴 (400mg × 体表面積)

ベクティビックス<sup>®</sup>点滴 (6mg × 体重)

# 点滴 1日目


## <メイン>

### ① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

## 携帯型ポンプ(インフューザーポンプ)



投与開始時

投与終了時

## <側管>

### ② 15分



お薬によるアレルギー  
や吐き気を予防する薬  
が混ざっています。

- ・パロノセトロン
- ・デキサート®

### ② 60分



ベクティビックス®が  
混ざっています

### ③ 90分



イリノテカン®が  
混ざっています

### ③ 2時間



レボホリナート®が  
混ざっています

### ④ 10~15分



フルオロウラシル®  
が混ざって  
います

### ⑤ 46時間



フルオロウラシル®が  
混ざって  
います

※3日目に終了します

## 飲み薬

(吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用