


フォルフィリ

FOLFIRI＋ラムシルマブ療法

- * 4種類の点滴薬（イリノテカン、レボホリナート、フルオロウラシル、サイラムザ®（＝ラムシルマブ））を組み合わせる治療法です。
- * 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目に4種類点滴します。フルオロウラシルは、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース = 2週間>

1~3日目 フルオロウラシル®点滴（ $2400\text{mg} \times \text{体表面積}$ ）



- 1日目** イリノテカン点滴（ $150\text{mg} \times \text{体表面積}$ ）
レボホリナート点滴（ $200\text{mg} \times \text{体表面積}$ ）
フルオロウラシル点滴（ $400\text{mg} \times \text{体表面積}$ ）
サイラムザ®点滴（ $8\text{mg} \times \text{体重}$ ）


点滴 1日目

<メイン> ① 血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします



携帯型ポンプ(インフューザーポンプ)



投与開始時

投与終了時

<側管>

② 15分

③ 初回: 1時間

2回目以降: 30分~1時間

④ 10~15分

⑤ 90分



イリノテカンが混ざっています

⑥ 10~15分

⑦ 46時間



フルオロウラシルが混ざっています



フルオロウラシルが混ざっています

※3日目に終了します

⑤ 2時間



レボホリナートが混ざっています

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。

- ・パロノセトロン
- ・デキサート®
- ・ポララミン®

サイラムザ®が混ざっています

(重要な注意)

アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。車の運転や危険を伴う作業は避けてください。投与後に症状があれば、治まるまで安静にしてください。

飲み薬

(吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用