


フォルフォキシリ

# FOLFOXIRI+ベバシズマブ療法

- \* 5種類の点滴薬（イリノテカン<sup>®</sup>、オキサリプラチン<sup>®</sup>、レボホリナート<sup>®</sup>、5-FU<sup>®</sup>、アバスチン<sup>®</sup>(=ベバシズマブ)）を組み合わせる治療法です。
- \* 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* 1日目に5種類点滴します。5-FU<sup>®</sup>は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース分= 2週間＞

1~3日目 5-FU<sup>®</sup>点滴（3200mg × 体表面積）



1日目

イリノテカン<sup>®</sup>点滴（165mg × 体表面積）

オキサリプラチン<sup>®</sup>点滴（85mg × 体表面積）

レボホリナート<sup>®</sup>点滴（200mg × 体表面積）

アバスチン<sup>®</sup>点滴（5mg × 体重）


# 点滴 1日目

## <メイン>

### ① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします



## <側管>

### ③10分



アバスチン®が混ざっています

### ②30分



お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・ホスアプレピタント

### ③15分



お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・パロノセトロン  
・デキサート®

### ④60分



irinotecan®が混ざっています

レボホリナート®が混ざっています

### ⑤ 2時間



オキサリプラチン®が混ざっています

### ⑤ 2時間



### ⑥ 46時間



5-FU®が混ざっています

※3日目に終了します

## 飲み薬

(吐き気止め) 2~4日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用