


フォルフィリ

FOLFIRI+ベバシズマブ療法

- * 4種類の点滴薬(イリノテカン[®]、レボホリナート[®]、フルオロウラシル[®]、アバスチン[®](=ベバシズマブ))を組み合わせる治療法です。
- * 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目に4種類点滴します。フルオロウラシル[®]は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース 分= 2週間＞

1~3日目 フルオロウラシル[®]点滴 (2400mg × 体表面積)



1日目

イリノテカン[®]点滴 (150mg × 体表面積)

レボホリナート[®]点滴 (200mg × 体表面積)

フルオロウラシル[®]点滴 (400mg × 体表面積)

アバスチン[®]点滴 (5mg × 体重)


点滴 1日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします



<側管>

アバスチン®が混ざっています



② 30分



③ 90分



イリノテカン®が混ざっています



④ 10~15分



フルオロウラシル®が混ざっています



⑤ 46時間



フルオロウラシル®が混ざっています

※3日目に終了します

② 15分



③ 2時間



レボホリナート®が混ざっています

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
 ・パロノセトロン
 ・デキサート®

飲み薬 (吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用