


IRIS+ベバシズマブ療法

- * 飲み薬(エスワン[®]錠)と点滴薬(イリノテカン[®]、アバスチン[®](=ベバシズマブ))を使う治療法です。
- * 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * エスワン[®]錠は、朝・夕食後の1日2回、14日間毎日続けて服用し14日間休みます。イリノテカン[®]、アバスチン[®](=ベバシズマブ)を1日目と15日目に点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース分=4週間>



エスワン[®]服用(1日2回 朝夕食後)/14日間



イリノテカン[®]点滴
(100mg × 体表面積)

アバスチン[®]点滴(5mg × 体重)



イリノテカン[®]点滴
(100mg × 体表面積)

アバスチン[®]点滴(5mg × 体重)

エスワン[®]休薬 14日間

点滴 1日目、15日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

アバステン®が混ざっています

②



10分かけて

③90分



イリノテカン®が混ざっています



②

15分



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。

- ・パロノセトロン
- ・デキサート®

飲み薬

(吐き気止め) 2、3日目
16、17日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用