

エスワン

イリノテカン

S-1(2投2休)+CPT-11療法

- * 飲み薬(エスワン錠)と点滴薬(イリノテカン)を使う治療法です。
- * 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * エスワン錠は、朝・夕食後の1日2回、14日間毎日続けて服用し14日間休みます。
イリノテカンを1日目と8日目に点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース = 4週間>

エスワン服用(1日2回 朝夕食後) 14日間



体表面積

1.25㎡未満

1.25㎡以上1.5㎡未満

1.5㎡以上

エスワン投与量

40mg/回

50mg/回

60mg/回

1

8

15

22

28(日)



エスワン休薬 14日間

イリノテカン点滴(80mg × 体表面積)

イリノテカン点滴(80mg × 体表面積)

点滴 1日目、8日目

<メイン>

① 血管ルート確保




生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 15分



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。
・グラニセトロン®
・デキサート®



③ 90分



イリノテカンが
混ざっています

飲み薬

(吐き気止め) 2、3日目
9、10日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用