


ロンサーフ+ベバシズマブ療法

- * 飲み薬(ロンサーフ[®]錠)と点滴薬(アバスチン[®](=ベバシズマブ))を使う治療法です。
- * 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * ロンサーフ[®]錠は、朝・夕食後の1日2回、5日間毎日続けて飲み、その後2日間お休みします。これを2回繰り返して、その後さらに2週間お休みします。
アバスチン[®]を1日目、15日目に点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース = 4週間>

ロンサーフ[®]服用(1日2回朝夕食後)



体表面積	ロンサーフ [®] 投与量
1.07㎡未満	35mg/回
1.07㎡以上1.23㎡未満	40mg/回
1.23㎡以上1.38㎡未満	45mg/回
1.38㎡以上1.53㎡未満	50mg/回
1.53㎡以上1.69㎡未満	55mg/回
1.69㎡以上1.84㎡未満	60mg/回
1.84㎡以上1.99㎡未満	65mg/回
1.99㎡以上2.15㎡未満	70mg/回
2.15㎡以上	75mg/回



アバスチン[®]点滴(5mg×体重)



アバスチン[®]点滴(5mg×体重)

ロンサーフ[®]休薬 14日間

点滴 1日目、15日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 10分

アバステン®が
混ざっています

