


# mFOLFOX6療法

- \* 3種類の点滴薬(オキサリプラチン<sup>®</sup>、レボホリナート<sup>®</sup>、フルオロウラシル<sup>®</sup>)を組み合わせて使う治療法です。
- \* 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* 1日目に3種類点滴します。フルオロウラシル<sup>®</sup>は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース 分= 2週間＞

1~3日目 フルオロウラシル<sup>®</sup>点滴 (2400mg × 体表面積)



1日目

オキサリプラチン<sup>®</sup>点滴 (85mg × 体表面積)

レボホリナート<sup>®</sup>点滴 (200mg × 体表面積)

フルオロウラシル<sup>®</sup>点滴 (400mg × 体表面積)


# 点滴 1日目

## <メイン>

### ① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします



## <側管>

### ② 15分



### ③ 2時間



オキサリプラチン®が混ざっています



### ④ 10~15分



### ⑤ 46時間



フルオロウラシル®が混ざっています

※3日目に終了します

お薬によるアレルギー  
や吐き気を予防する薬  
が混ざっています。  
・パロノセトロン  
・デキサート®

### ③ 2時間



レボホリナート®が混ざっています

飲み薬  
(吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用