


mFOLFOX6＋ベバシズマブ療法

- * 4種類の点滴薬(オキサリプラチン[®]、レボホリナート[®]、フルオロウラシル[®]、アバスチン[®](=ベバシズマブ))を組み合わせる治療法です。
- * 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目に4種類点滴します。フルオロウラシル[®]は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 2週間>

1~3日目 フルオロウラシル[®]点滴 (2400mg × 体表面積)



1日目

オキサリプラチン[®]点滴 (85mg × 体表面積)

レボホリナート[®]点滴 (200mg × 体表面積)

フルオロウラシル[®]点滴 (400mg × 体表面積)

アバスチン[®]点滴 (5mg × 体重)


点滴 1日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします



<側管>

② 10分

アバステチン®が混ざっています



③ 2時間

オキサリプラチン®が混ざっています



④ 10~15分

フルオロウラシル®が混ざっています



⑤ 46時間

フルオロウラシル®が混ざっています



※3日目に終了します

② 15分

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
 ・パロノセトロン
 ・デキサート®



③ 2時間

レボホリナート®が混ざっています



飲み薬 (吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用