


FOLFIRINOX療法

- * 4種類の点滴薬(オキサリプラチン[®]、イリノテカン[®]、レボホリナート[®]、フルオロウラシル[®])を組み合わせて使う治療法です。
- * 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目に4種類点滴します。フルオロウラシル[®]は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 2週間>

1~3日目 フルオロウラシル[®]点滴 (2400mg × 体表面積)



1日目

オキサリプラチン[®]点滴 (85mg × 体表面積)

イリノテカン[®]点滴 (180mg × 体表面積)

レボホリナート[®]点滴 (200mg × 体表面積)

フルオロウラシル[®]点滴 (400mg × 体表面積)

点滴 1日目


<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

携帯型ポンプ(インフューザーポンプ)



投与開始時

投与終了時

<側管>

② 15分 → ③ 2時間 → ④ 30分 → ⑤ 90分



⑥ 10~15分 → ⑦ 46時間



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。
・パロノセトロン
・デキサート®

オキサリプラチン®が
混ざっています

④ 2時間
レボホリナート®が
混ざっています

イリノテカン®が
混ざっています

フルオロウラシル®が
混ざっています

フルオロウラシル®が
混ざっています
※3日目に終了します

飲み薬

(吐き気止め)

1日目



アプレピタントカプセル125mg 1回1個 オキサリプラチン®点滴(③)開始1時間前に服用

2、3日目



アプレピタントカプセル80mg 1回1個 1日1回 朝食後に服用

2~4日目



デカドロン®錠4mg 1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用