


# FOLFIRINOX療法

- \* 4種類の点滴薬(オキサリプラチン、イリノテカン、レボホリナート、フルオロウラシル)を組み合わせて使う治療法です。
- \* 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* 1日目に4種類点滴します。5-FU<sup>®</sup>は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

## <1コース分= 2週間>

1~3日目 フルオロウラシル点滴 (2400mg × 体表面積)



### 1日目

オキサリプラチン点滴 (85mg × 体表面積)

イリノテカン点滴 (200mg × 体表面積)

レボホリナート点滴 (200mg × 体表面積)

フルオロウラシル点滴 (400mg × 体表面積)

# 点滴 1日目

## <メイン>


### ① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

イリノテカンによる副作用(コリン作動性症候群)を予防する薬が混ざっています。  
・アトロピン®

## 携帯型ポンプ(インフューザーポンプ)



投与開始時

投与終了時

## <側管>

② 15分 → ③ 2時間 → ④ 30分 → ⑤ 90分



⑥ 10~15分 → ⑦ 46時間



お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・パロノセトロン  
・デキサート®

オキサリプラチン®が混ざっています

④ 2時間  
レボホリナート®が混ざっています

イリノテカン®が混ざっています

フルオロウラシル®が混ざっています

フルオロウラシル®が混ざっています  
※3日目に終了します

## 飲み薬

(吐き気止め)

1日目



アプレピタントカプセル125mg 1回1個 オキサリプラチン®点滴(③)開始1時間前に服用

2、3日目



アプレピタントカプセル80mg 1回1個 1日1回 朝食後に服用

2~4日目



デカドロン®錠4mg 1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用