モディファイド　フォルフィリノックス

mFOLFIRINOX療法

＊ 4種類の点滴薬（オキサリプラチン®、イリノテカン®、レボホリナート®、フルオロウラシル®）を組み合わせて使う治療法です。
＊ 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
＊ 1日目に4種類点滴します。フルオロウラシル®は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
＊ 体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース 分= 2週間＞

1~3日目　フルオロウラシル®点滴（2400mg×体表面積）



1日目

オキサリプラチン®点滴（85mg×体表面積）
イリノテカン®点滴（150mg×体表面積）
レボホリナート®点滴（200mg×体表面積）

川崎市立多摩病院　化学療法運営委員会
薬剤部

点滴　1日目

＜メイン＞

① 血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

イリノテカン®による副作用（コリン作動性症候群）を予防する薬が混ざっています。
・アトロピン®

携帯型ポンプ（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ）



投与開始時　投与終了時

＜側管＞

② 30分 → ③ 15分 → ④ 2時間 → ⑤ 30分 → ⑥ 90分 → ⑦ 46時間

お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・パロノセトロン
・デキサート®

オキサリプラチン®が混ざっています

⑤ 2時間

レボホリナート®が混ざっています

イリノテカン®が混ざっています

フルオロウラシル®が混ざっています
※3日目に終了します

飲み薬（吐き気止め）

2～4日目

デカドロン®錠4mg　　1回1個　1日2回　朝・昼食後に服用