初発　テモゾロミド点滴維持＋ベバシズマブ(2週間隔)

＊　点滴薬（テモダール® ＝テモゾロミド、アバスチン®＝ベバシズマブ）を使う治療法です。
＊　28日間を1コースとして以下の治療を行います。
＊　テモダール®は、1～5日目に、アバスチン®は、1日目、15日目に点滴します。

＜1コース 分 ＝ 28日間＞

アバスチン®点滴（10mg×体重）　　**アバスチン®点滴（10mg×体重）**



テモダール®点滴
（150mgまたは200mg×体表面積）

川崎市立多摩病院　化学療法運営委員会
薬剤部

点滴　1日目

＜メイン＞　①　血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

②　15分

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・パロノセトロン

②　20分

アバスチン®が混ざっています

→

③　90分

テモダール®が混ざっています

→　終了

点滴　2～5日目

＜メイン＞　①　血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

②　90分　→　終了

テモダール®が
混ざっています

点滴　15日目

＜メイン＞①　血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします

＜側管＞

②　20分

→　終了

アバスチン®が
混ざっています