


カペシタビン シスプラチン

# Cape + CDDP療法 (ショートハイドレーション)

- \* 飲み薬(カペシタビン錠)と点滴薬(シスプラチン)を使う治療法です。
- \* 3週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* カペシタビン錠は、朝・夕食後の1日2回、14日間毎日続けて服用し7日間休みます。シスプラチンを1日目に点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

## <1コース = 3週間>



# 点滴 1日目

<メイン>

①1時間



②30分



③15分



④1時間




腎臓への影響を防ぐために必要な電解質を補充します。  
・硫酸マグネシウム



お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・プロイメンド®




お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・グラニセトロン  
・デキササート®



シスプラチンが混ざっています

→ ⑤シスプラチン終了後に注射



⑥1時間



⑦1時間 → 終了



利尿剤を注射します。腎臓への影響を防ぐために尿の量を増やしシスプラチンの排泄を促します。  
・フロセミド



## 飲み薬(吐き気止め)

1~4日目



オランザピンOD錠5mg

1回1個 1日1回 夕食後に服用

2~4日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用