


カペシタビン

シスプラチン

# Cape + CDDP + トラスツズマブ療法 (ショートハイドレーション)

- \* 飲み薬(カペシタビン錠)と点滴薬(シスプラチン、トラスツズマブ)を使う治療法です。
- \* 3週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* カペシタビン錠は、朝・夕食後の1日2回、14日間毎日続けて服用し7日間休みます。  
シスプラチン、トラスツズマブを1日目に点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

## <1コース = 3週間>



トラスツズマブ点滴 (初回8mg × 体重、2回目以降6mg × 体重)

シスプラチン点滴 (80mg × 体表面積)

# 点滴 1日目

<メイン>

①1時間



②30分



③15分



④初回90分

2回目以降30~90分



腎臓への影響を防ぐために必要な電解質を補充します。  
・硫酸マグネシウム



お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・ホスアプレピタント



お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・グラニセトロン  
・デキサート®



トラスツズマブが混ざっています

⑤1時間



⑥シスプラチン終了後に注射



⑦1時間



⑧1時間 → 終了



シスプラチンが混ざっています



利尿剤を注射します。  
腎臓への影響を防ぐために尿の量を増やしシスプラチンの排泄を促します。  
・フロセミド



## 飲み薬(吐き気止め)

1~4日目



オランザピンOD錠5mg 1回1個 1日1回 夕食後に服用

2~4日目



デカドロン®錠4mg 1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用