


エフピー

# FP(800/80) + ニボルマブ療法

- \* 点滴薬(フルオロウラシル、シスプラチン、オプジーボ<sup>®</sup>)を使う治療法です。
- \* 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* シスプラチンは1日目、フルオロウラシルは、1~5日目、オプジーボ<sup>®</sup>は1日目と15日目に点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 4週間>



# 点滴 1日目

## <メイン>

### ① 血管ルート確保

生理食塩液の点滴をします



## <側管>

### ② 30分 → ③ 24時間



オプジーボ®が混ざっています



フルオロウラシルが混ざっています

### ③ 2時間 → ④ 30分 → ⑤ 15分 → ⑥ 1時間 → ⑦ 翌日まで



お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・プロイメド®



お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・パロノセトロン  
・デキサート®



シスプラチンが混ざっています



## 飲み薬(吐き気止め) 1~4日目



オランザピンOD錠5mg 1回1個 1日1回 夕食後に服用

# 点滴 2~4日目

## <メイン> ① 24時間



フルオロウラシルが  
混ざっています

## <側管> ① 15分 → ② 翌日まで



お薬によるアレルギー  
や吐き気を予防する薬  
が混ざっています。  
・デキサート®



## 飲み薬(吐き気止め) 1~4日目



オランザピンOD錠5mg 1回1個 1日1回 夕食後に服用

# 点滴 5日目

## <メイン> ① 24時間



フルオロウラシルが  
混ざっています

## <側管> ① 24時間



# 点滴 15日目

<メイン> ① 血管ルート確保



<側管> ② 30分



オブジーボ®が  
混ざっています