


mFOLFOX6 + トラスツズマブ療法

- * 4種類の点滴薬(オキサリプラチン[®]、レボホリナート[®]、フルオロウラシル[®]、トラスツズマブ)を組み合わせて使う治療法です。
- * 2週間(トラスツズマブは3週間)を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目に4種類点滴します。フルオロウラシル[®]は、携帯型ポンプを使用し2日目まで持続点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

＜1コース 分= 2週間＞

1~2日目 フルオロウラシル[®]点滴 (2400mg × 体表面積)



1日目

トラスツズマブ点滴(初回 8mg × 体重、2回目以降 6mg × 体重)

オキサリプラチン[®]点滴 (85mg × 体表面積)

レボホリナート[®]点滴 (200mg × 体表面積)

フルオロウラシル[®]点滴 (400mg × 体表面積)


点滴 1日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします



<側管>

② 15分



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。
・パロノセトロン
・デキサート®

③ 90分



トラスツズマブが混ざっています

③ 2時間



オキサリプラチン®が混ざっています

③ 2時間



レボホリナート®が混ざっています

④ 10~15分



フルオロウラシル®が混ざっています

⑤ 46時間



フルオロウラシル®が混ざっています

※2日目に終了します

飲み薬 (吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用