


FP(800/80) 療法

- * 点滴薬(フルオロウラシル[®]、シスプラチン[®])を使う治療法です。
- * 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * シスプラチン[®]は1日目、フルオロウラシル[®]は、1~5日目に点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 4週間>



シスプラチン[®]点滴
(80mg × 体表面積)

フルオロウラシル[®]点滴
(800mg × 体表面積)

点滴 1日目

<メイン> ①24時間かけて



フルオロウラシル®が混ざっています

<側管> ① 2時間 → ② 30分 → ③ 15分 → ④1時間 → ⑤翌日まで



お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。
・プロイメド®



お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・アロキシ®
・デキサート®



シスプラチン®が混ざっています



飲み薬(吐き気止め) 1~4日目



オランザピンOD錠5mg 1回1個 1日1回 夕食後に服用

点滴 2~4日目

<メイン> ①24時間かけて



フルオロウラシル®が
混ざっています

<側管>

① 15分



②翌日まで



デキサート®
または
プラセボ
が混ざっています。



点滴 5日目

<メイン> ① 24時間かけて



フルオロウラシル®が
混ざっています

<側管> ① 24時間かけて

