


# S-1+CDDP療法(ショートハイドレーション)

- \* 飲み薬(エスワン錠)と点滴薬(シスプラチン)を使う治療法です。
- \* 5週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* エスワン錠は、朝・夕食後の1日2回、21日間毎日続けて服用し14日間休みます。シスプラチンは、エスワン錠の服用を始めてから8日目に点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

## <1コース = 5週間>



# 点滴 8日目

<メイン>

①1時間 → ②30分 → ③15分 → ④1時間



腎臓への影響を防ぐために必要な電解質を補充します。  
・硫酸マグネシウム®



お薬による吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・ホスアプレピタント



お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・グラニセトロン®  
・デキサート®



シスプラチン®が混ざっています

⑤シスプラチン終了後に注射 → ⑥1時間 → ⑦1時間 → 終了



利尿剤を注射します。腎臓への影響を防ぐために尿の量を増やしシスプラチン®の排泄を促します。  
・フロセミド



## 飲み薬(吐き気止め)

8~11日目



オランザピンOD®錠5mg 1回1個 1日1回 夕食後に服用

9~11日目



デカドロン®錠4mg 1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用