


Weekly PTX+ラムシルマブ療法

- * 2種類の点滴薬（パクリタキセル[®]とサイラムザ[®](=ラムシルマブ)）を組み合わせる治療法です。
- * 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * パクリタキセル[®]は、1、8、15日目に、サイラムザ[®]は1、15日目に点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 4週間>



点滴 1、15日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 15分



③ 初回:1時間

2回目以降:30分~1時間



④ 1時間



終了

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。

- ・デキサート®
- ・ファモチジン®
- ・ポララミン®



サイラムザ®が混ざっています



パクリタキセル®が混ざっています

(重要な注意)

パクリタキセル®点滴にはアルコールが含まれています。また、アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

投与後、アルコールの症状が治まるまでは安静にしてください。

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。

- ・デキサート®
- ・ファモチジン®
- ・ポララミン®

② 15分 → ③ 30分 → ④ 1時間 → 終了



パクリタキセル®が混ざっています

(重要な注意)

パクリタキセル®点滴にはアルコールが含まれています。

また、アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起ることがあります。車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

投与後、アルコールの症状が治まるまでは安静にしてください。