


Weekly nab-PTX＋ラムシルマブ療法

- * 2種類の点滴薬(アブラキサン[®](=ナブパクリタキセル)とサイラムザ[®](=ラムシルマブ))を組み合わせて使う治療法です。
- * 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * アブラキサン[®]は、1、8、15日目に、サイラムザ[®]は1、15日目に点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース分=4週間>



点滴 1、15日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管> ②15分 → ③初回:1時間 → ④全開 → ⑤30分 → ⑥全開 → 終了
2回目以降:30分~1時間



お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・デキサート®
・ポララミン®



サイラムザ®が混ざっています



アブラキサン®が混ざっています



(重要な注意)

また、アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。
車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 15分 → ③ 全開 → ④ 30分 → ⑤ 全開 → 終了

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・デキサート®



アブラキサン®が混ざっています