


# Weekly nab-PTX＋ラムシルマブ療法

- \* 2種類の点滴薬(アブラキサン<sup>®</sup>(=ナブパクリタキセル)とサイラムザ<sup>®</sup>(=ラムシルマブ))を組み合わせて使う治療法です。
- \* 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- \* アブラキサン<sup>®</sup>は、1、8、15日目に、サイラムザ<sup>®</sup>は1、15日目に点滴します。
- \* 体表面積は身長と体重から計算されます。

## <1コース 分= 4週間>



# 点滴 1、15日目

## <メイン>

### ① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

## <側管>

② 15分 → ③ 初回:1時間  
2回目以降:30分~1時間

④ 全開 → ④ 30分 → 終了

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。

- ・デキサート®
- ・ポララミン®



サイラムザ®が混ざっています



アブラキサン®が混ざっています

### ( 重要な注意 )

また、アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起こることがあります。  
車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

## <メイン>

### ① 血管ルート確保




生理食塩液の点滴をします


## <側管>

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。  
・デキサート®

### ② 15分




### ③ 全開



### ④ 30分



アブラキサン®が混ざっています



### 終了