


mFOLFOX6療法

- * 3種類の点滴薬(オキサリプラチン[®]、レボホリナート[®]、フルオロウラシル[®])を組み合わせて使う治療法です。
- * 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目に3種類点滴します。フルオロウラシル[®]は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 2週間>

1~3日目 フルオロウラシル[®]点滴 (2400mg × 体表面積)



1日目

オキサリプラチン[®]点滴 (85mg × 体表面積)

レボホリナート[®]点滴 (200mg × 体表面積)

フルオロウラシル[®]点滴 (400mg × 体表面積)


点滴 1日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします



<側管>

② 15分



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。

- ・アロキシ®
- ・デキサート®



③ 2時間



オキサリプラチン®が混ざっています



④ 10~15分



フルオロウラシル®が混ざっています



⑤ 46時間



フルオロウラシル®が混ざっています

※3日目に終了します

レボホリナート®が混ざっています

③ 2時間



飲み薬
(吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用