


mFOLFOX6+ニボルマブ療法

- * 4種類の点滴薬(オキサリプラチン[®]、レボホリナート[®]、フルオロウラシル[®]、オプジーボ[®](=ニボルマブ))を組み合わせて使う治療法です。
- * 2週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目に4種類点滴します。フルオロウラシル[®]は、携帯型ポンプを使用し3日目まで持続点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 2週間>

1~3日目 フルオロウラシル[®]点滴 (2400mg × 体表面積)



1日目

オプジーボ[®]点滴 (240mg)

オキサリプラチン[®]点滴 (85mg × 体表面積)

レボホリナート[®]点滴 (200mg × 体表面積)

フルオロウラシル[®]点滴 (400mg × 体表面積)

点滴 1日目

<メイン> ① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

② 15分 → ③ 30分 → ④ 2時間 → ⑤ 10~15分 → ⑥ 46時間



お薬によるアレルギー
や吐き気を予防する薬
が混ざっています。
・アロキシ®
・デキサート®

オプジーボ®が
混ざっています

オキサリプラチン®が
混ざっています


フルオロウラシル®
が混ざっています

フルオロウラシル®
が混ざっています
※3日目に終了します

④ 2時間



レボホリナート®が
混ざっています



飲み薬
(吐き気止め) 2、3日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用