

カルボプラチン

ゲムシタビン

CBDCA+GEM療法

- * 点滴薬(カルボプラチン[®]、ゲムシタビン[®])を使う治療法です。
- * 3~4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * 1日目にカルボプラチン[®]を、1、8日目にゲムシタビン[®]を点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 3~4週間>



カルボプラチン[®]点滴
(5~6AUC)

※腎機能に応じて量を調節します

ゲムシタビン[®]点滴
(1000mg × 体表面積)

ゲムシタビン[®]点滴
(1000mg × 体表面積)

点滴 1日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

②30分 → ③15分 → ④30分 → ⑤ 1時間 → ⑥2時間 → 終了



お薬による吐き気を
予防する薬が混
ざっています。
・ホスアプレピタント



お薬によるアレルギーや
吐き気を予防する薬が混
ざっています。
・グラニセトロン®
・デキササート®



ゲムシタビン®が
混ざっています



カルボプラチン®が
混ざっています



飲み薬(吐き気止め)

2、3、4日目



デカドロン®錠4mg

1回1個 1日2回 朝・昼食後に服用

点滴 8日目


<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>



お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。
・デキサート®



ゲムシタビン®が混ざっています