

カバジタキセル療法

- * 飲み薬(プレドニン[®]錠(=プレドニゾロン))と点滴薬(ジェブタナ[®](=カバジタキセル))を使う治療法です。
- * 3週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * プレドニン[®]錠は、朝・昼食後の1日2回、毎日続けて服用します。
- * 1日目にジェブタナ[®]を点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 3週間>



プレドニン[®]錠5mg 服用(1回1個 1日2回 朝・昼食後)

1



ジェブタナ[®]点滴
(25mg × 体表面積)

21
(日)

点滴 1日目

<メイン>

① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

お薬によるアレルギーや吐き気を予防する薬が混ざっています。

- ・デキサート®
- ・ファモチジン®
- ・ポララミン®

② 15分 → ③ 30分 → ④ 1時間 → 終了



ジェブタナ®が混ざっています

(重要な注意)

ジェブタナ®点滴にはアルコールが含まれています。

また、アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが起ることがあります。車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

投与後、アルコールの症状が治まるまでは安静にしてください。