


ゲムシタビン／パクリタキセル

GEM/PTX療法

- * 2種類の点滴薬（ゲムシタビン[®]、パクリタキセル[®]）を使う治療法です。
- * 3週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。
- * ゲムシタビン[®]は1日目と8日目に点滴します。
- * パクリタキセル[®]は、1日目に点滴します。
- * 体表面積は身長と体重から計算されます。

<1コース 分= 3~4週間>



点滴 1日目

<メイン> ① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

(重要な注意)

パクリタキセル®点滴にはアルコールが含まれています。

また、アレルギー予防の薬(ポララミン®)により眠気やふらつきが
起こることがあります。車の運転や危険を伴う作業は避けてください。

投与後、アルコールの症状が治まるまでは安静にしてください。

<側管>

お薬によるアレルギーや
吐き気を予防する薬が混
ざっています。

- ・デキサート®
- ・ファモチジン®
- ・ポララミン®

② 15分 → ③ 30分 → ④ 3時間 → ⑤ 30分 → 終了



パクリタキセル®が
混ざっています



ゲムシタビン®が
混ざっています

点滴 8日目

<メイン> ① 血管ルート確保



生理食塩液の点滴をします

<側管>

お薬によるアレルギーや
吐き気を予防する薬が混
ざっています。

- ・デキサート®

② 15分 → ③ 30分 → 終了



ゲムシタビン®が
混ざっています